



T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

**TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI
(TUS)
(Sonbahar Dönemi)
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ
25 EYLÜL 2016
PAZAR ÖĞLEDEN SONRA**

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



Bu testte 120 soru vardır.

1.

3. Geç konjenital sifilizde aşağıdaki bulgulardan hangisi görülür?

- A) Nefrotik sendrom B) Hemolitik anemi
C) Palmar ekzantem D) Yaygın lenfadenopati
E) İnterstisyel keratit

■ DOĞRU YANIT: E

4.

2.





5.

7. Pulmoner kapiller kama (wedge) basıncı aşağıdakilerden hangisinin basıncını gösterir?

- A) Sol atrium
- B) Sağ atrium
- C) Aort kapak kapanması
- D) Sağ ventrikül
- E) Triküspit kapak kapanması

■ DOĞRU YANIT: A

8.

6.

9.





10.

13.

11.

14.

12.

15. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin oluşturduğu hepatotoksisite, histopatolojik bulguları bakımından non-alkolik steatohepatit ile benzerlik gösterir?

- A) Fenotiazinler B) Halotan
C) Parasetamol D) Statinler
E) Amiodaron

DOĞRU YANIT: E



16.

18.

17.

19.

ÖS

SYM





20.

22.

21.

23.

24.



25.

27. Hipertansiyon tanısı konulan ve diğer fizik inceleme bulguları normal olan 24 yaşındaki erkek hastanın serum kreatinin düzeyi: 0,9 mg/dL ve serum potasyum düzeyi: 2,8 mEq/L bulunuyor.

Plazma renin aktivitesi ve serum aldosteron düzeyi düşük olan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gitelman sendromu
- B) Tek taraflı renal arter stenozu
- C) Liddle sendromu
- D) Adrenal adenom
- E) Bartter sendromu

DOĞRU YANIT: C

28.

26.



29.

31.

30.

32.

ÖS

SYM





33.

35.

34.

36.

ÖS

YMM





37.

39.

38.

40.

Ö

S

SYM





41.

43.

42.

44. Sekiz yaşındaki çocuk, 2 gün önce sol kolundan bir sokak köpeğinin ısırması nedeniyle getiriliyor. Çocuğun bu olaydan önce tamamen sağlıklı olduğu ve hiç kuduz aşısı olmadığı öğreniliyor.

Bu çocukla ilgili en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sadece kuduz aşısı yara çevresine yapılır.
- B) Sadece kuduz aşısı sağ deltoid kasa yapılır.
- C) Kuduz aşısı sağ deltoid kasa yapılır, yara çevresine kuduz immüno globulini uygulanır.
- D) Kuduz aşısı ve kuduz immüno globulini yara çevresine uygulanır.
- E) Kuduz aşısı sağ gluteal bölgeye yapılır, yara çevresine kuduz immüno globulini uygulanır.

DOĞRU YANIT: C



45.

47.

46.

48.

ÖS

SYM





49.

52.

50.

53.

51. Doğum sonrası resüsitasyon gereksinimi olan bir bebekte aşağıdakilerden hangisi ilk uygulamalar arasında yer almaz?

- A) Taktil uyarma
- B) Hava yollarının temizlenmesi
- C) Kalp hızının değerlendirilmesi
- D) Kurutma ve ısıtma
- E) Endotrakeal entübasyon

DOĞRU YANIT: E





54.

57.

55.

58.

56.





59.

61.

60.

62.

63.



64.

67.

65.

68.

66.



69.

71.

70. On yaşındaki kız çocuğu, son altı aydır giderek artan konuşma güçlüğü şikâyetiyle getiriliyor. Fizik muayenesinde yüz mimiklerinde azalma ve yürürken distoni olduğu gözleniyor. Laboratuvar incelemesinde Coombs negatif hemolitik anemi bulguları ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Subakut sklerozan panensefalit
- B) Wilson hastalığı
- C) Friedreich ataksisi
- D) Epstein-Barr virus enfeksiyonu
- E) Spinocerebellar ataksi

DOĞRU YANIT: B

72.

73.

74.



75.

77. Sağlıklı bireylerde glutamin metabolizması ve fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Esansiyel bir amino asittir.
- B) Glutasyon prekürsörüdür.
- C) Lenfosit ve makrofajlar için önemli bir enerji kaynağıdır.
- D) Enterosit fonksiyonunu korur.
- E) Vücuttaki glutamin depolarının yaklaşık %75'i iskelet kasında bulunur.

■ DOĞRU YANIT: A

76.

78.

79.



80.

82.



81.



83.



Ö

S

Y

M





84.

87. Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidizm tanısını desteklemez?

- A) Serum kalsiyum düzeyinde artma
- B) Serum parathormon düzeyinde artma
- C) Serum klor düzeyinde azalma
- D) Serum fosfat düzeyinde azalma
- E) Serum klor/fosfat oranında artma

DOĞRU YANIT: C

88.

85.

86.

89.



90.

92.

91.

93.

94.



95. Aşağıdakilerden hangisi kronik intestinal psödoobstrüksiyonun nedenleri arasında yer almaz?

- A) Sekonder peritonit
- B) Visseral miyopatiler
- C) Amiloidoz
- D) Kollajen vasküler hastalıklar
- E) Radyasyon enteriti

DOĞRU YANIT: A

98.

96.

99.

97.



100.

102.

101.

103. Pankreatikoduodenektomi ameliyatı sonrası en sık görülen morbidite aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pankreas fistülü gelişmesi
- B) Ekzokrin yetmezlik gelişmesi
- C) Karın içi apse oluşması
- D) Safra kaçağı gelişmesi
- E) Mide boşalmasında gecikme

DOĞRU YANIT: E



104.

106.

105.

107.

108.

109.

112.

110.

113.

111.

114. Gartner kanalı kisti embriyonik olarak aşağıdaki yapılardan hangisinin kistik dilatasyonu sonucu oluşur?

- A) Genital tüberkül
- B) Paramezonefrik kanal
- C) Ürogenital sinüs
- D) Embriyonik peritoneal membran
- E) Mezonefrik kanal

DOĞRU YANIT: E



115.

117.



116.

118.



119.





120.

ÖSYM

